
Introduction aux développements limités

Exercice 6.

On pourra commencer par constater que le cours affirme que la réponse est oui si l'on fait une hypothèse supplémentaire de régularité sur la fonction.

Autocorrection

Autocorrection A.

- (i) $e^x \sqrt[3]{1+x} = 1 + \frac{4}{3}x + \frac{13}{18}x^2 + \frac{23}{81}x^3 + o(x^3);$
- (ii) $\sin(x) \ln(1+x) = x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3);$
- (iii) $\sqrt{1+\sin x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{48}x^3 + o(x^3);$
- (iv) $(e^x - 1) \sin x = x^2 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3);$
- (v) $\frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2 + o(x^2);$
- (vi) $e^{\cos x} - (1+x)^{\frac{1}{x}} = \frac{e}{2}x - \frac{23}{24}ex^2 + o(x^2);$
- (vii) $(\sin x)^4 = x^4 - \frac{2}{3}x^6 + \frac{1}{5}x^8 + o(x^8);$
- (viii) $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^6);$
- (ix) $\frac{xe^{-x}}{2x+1} = x - 3x^2 + \frac{13}{2}x^3 - \frac{79}{6}x^4 + o(x^4);$
- (x) $(\cos x)^{1/x} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 - \frac{5}{48}x^3 + o(x^3);$
- (xi) $(2+h)^4 = 16 + 32h + 24h^2 + 8h^3 + h^4 + o(h^{100});$
- (xii) $\sqrt{1+h} = 1 + \frac{1}{2}h - \frac{1}{8}h^2 + o(h^2);$
- (xiii) $\frac{1}{1+(1+h)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}h + \frac{1}{8}h^2 + o(h^2);$
- (xiv) $\exp(1+h) = e + eh + \frac{e}{2}h^2 + \frac{e}{6}h^3 + o(h^3);$
- (xv) $\sin\left(\frac{\pi}{3} + h\right) \cos\left(3\left(\frac{\pi}{3} + h\right)\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}h + \frac{5\sqrt{3}}{2}h^2 + o(h^2);$
- (xvi) $\sqrt{\tan\left(\frac{\pi}{4} + h\right)} = 1 + h + \frac{1}{2}h^2 + \frac{5}{6}h^3 + o(h^3);$
- (xvii) $\frac{(1+h) \ln(1+h)}{(1+h)^2 - 1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{12}h^2 + \frac{1}{12}h^3 + o(h^3).$

Autocorrection B.

Dans la plupart des questions, on aura une fraction $x \mapsto \frac{u(x)}{v(x)}$, et on pourra calculer des équivalents $u(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \lambda x^n$ et $v(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \mu x^m$.

- Si $n \geq m$, le cours garantit que $\frac{u(x)}{v(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\lambda}{\mu} x^{n-m}$, ce qui donne immédiatement la limite, à savoir : 0 si $n > m$; λ/μ si $n = m$.
- Si $n < m$, le même raisonnement montre que l'inverse $\frac{v}{u}$ vérifie $\frac{v(x)}{u(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\mu}{\lambda} x^{m-n} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, ce qui montre que la fraction de départ diverge, parce que $\left| \frac{u(x)}{v(x)} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$.

On dira plus tard que l'on a un équivalent $\frac{u(x)}{v(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{\lambda}{\mu} x^{n-m}$, ce qui donnera bien $\left| \frac{u(x)}{v(x)} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$.

(i) Le dénominateur est $\frac{1}{3}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$, donc $\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{3}x^3$.

Le numérateur est $-\frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$, donc $\underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{2}x^2$.

La fonction diverge donc en 0.

(ii) On a $\tan h \underset{h \rightarrow 0}{\sim} h$. Par ailleurs,

$$\begin{aligned} \ln(2(1+h)^2 - 1) &= \ln(1 + 4h + 2h^2) \\ &= (4h + 2h^2) + o_{h \rightarrow 0}(h) \quad \text{car } \begin{cases} \ln(1+u) = u + o_{u \rightarrow 0}(u) \\ 4h + 2h^2 \underset{h \rightarrow 0}{\sim} 4h \end{cases} \\ &= 4h + o_{h \rightarrow 0}(h) \\ &\underset{h \rightarrow 0}{\sim} 4h, \end{aligned}$$

$$\text{donc } \frac{\ln(2(1+h)^2 - 1)}{\tan((1+h)-1)} \underset{h \rightarrow 0}{\sim} 4$$

$$\text{donc } \frac{\ln(2(1+h)^2 - 1)}{\tan((1+h)-1)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 4$$

$$\text{donc } \frac{\ln(2x^2 - 1)}{\tan(x-1)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 4.$$

(iii) On a $\frac{1}{x^3} - \frac{1}{\sin^3 x} = \frac{\sin^3 x - x^3}{x^3 \sin^3 x}$.

On a déjà $x^3 \sin^3 x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^6$.

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} \sin^3 x - x^3 &= \left(x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \right)^3 - x^3 \\ &= x^3 \left(1 - \frac{x^2}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^2) \right)^3 - x^3 \\ &= x^3 \left(1 - 3 \frac{x^2}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^2) \right) - x^3 \quad \text{car } \begin{cases} (1+u)^3 = 1 + 3u + o_{u \rightarrow 0}(u) \\ -\frac{x^2}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{6} \end{cases} \\ &= -\frac{1}{2}x^5 + o_{x \rightarrow 0}(x^5) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{2}x^5. \end{aligned}$$

Ainsi, cette fonction diverge en 0.

(iv) On a

$$\begin{aligned}
 x - \arctan x &= x - \left(x - \frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \right) \\
 &= \frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3) \\
 \text{et } \sin^3 x &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^3}{3} \\
 \text{donc } \frac{x - \arctan x}{\sin^3 x} &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{3} \\
 \text{donc } \frac{x - \arctan x}{\sin^3 x} &\xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

(v) On a

$$\begin{aligned}
 (1+h)^3 + 7(1+h)^2 - 8 &= \left(1 + 3h + o_{h \rightarrow 0}(h) \right) + 7 \left(1 + 2h + o_{h \rightarrow 0}(h) \right) - 8 \\
 &= 17h + o_{h \rightarrow 0}(h) \\
 \text{et } (1+h)^4 + (1+h)^3 - 2 &= \left(1 + 4h + o_{h \rightarrow 0}(h) \right) + \left(1 + 3h + o_{h \rightarrow 0}(h) \right) - 2 \\
 &= 7h + o_{h \rightarrow 0}(h) \\
 &\underset{h \rightarrow 0}{\sim} 7h.
 \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \frac{(1+h)^3 + 7(1+h)^2 - 8}{(1+h)^4 + (1+h)^3 - 2} \underset{h \rightarrow 0}{\sim} \frac{7}{17}$$

$$\text{donc } \frac{(1+h)^3 + 7(1+h)^2 - 8}{(1+h)^4 + (1+h)^3 - 2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{7}{17}.$$

In fine,

$$\frac{x^3 + 7x^2 - 8}{x^4 + x^3 - 2} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{7}{17}.$$

(vi) On a $(\cos x)^{\ln|x|} = \exp(\ln|x| \ln \cos x)$. Par ailleurs,

$$\begin{aligned}
 \ln \cos x &= \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \\
 &= \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + o_{x \rightarrow 0}(x^2) \quad \text{car } \begin{cases} \ln(1+u) = u + o_{u \rightarrow 0}(u) \\ -\frac{x^2}{2} + o(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2} \end{cases} \\
 &= -\frac{x^2}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^2).
 \end{aligned}$$

Cela entraîne que $\ln \cos x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, et même que $\frac{\ln \cos x}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Par ailleurs, par croissances comparées, on a

$$x \ln|x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Ainsi,

$$\ln|x| \ln \cos x = (x \ln|x|) \frac{\ln \cos x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Par continuité de l'exponentielle, on en déduit :

$$(\cos x)^{\ln|x|} = \exp(\ln|x| \ln \cos x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \exp(0) = 1.$$